

| Classe de médicaments | Indications | Dénomination Commune Internationale | équivalents et remarques | posologie |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Corticoïdes | Anti-inflammatoire puissant | Bétamétose | Solupred | 0,05mg à 2mg /kg/jour |
| Antidouleur niveau 1 | Antalgique de première intention | Paracétamol 1g | doliprane, efferalgon, dafalgan... | 1g X 4 /jour (enfant 40mg/kg /j) |
| Antidouleur niveau 2 | Antidouleur supérieur au paracétamol | Tramadol | Propofan, Ixprim, Zaldiar, Lamaline, | 1 à 2 cpX4/j max 8/j |
| Antispasme | Lutte contre les douleurs abdominales | Phloroglucinol 200 mg | Spasfon Lyoc et comprimés | 1 à 2 cpX4/j |
| Anti-inflammatoire | Lutte contre l'inflammation et la douleur | Kétoprofène 50 mg | Ibuprofène 400 mg | 1 cpX3 /j |
| Coronarodilatateur * | Médicament de l'angine de poitrine | Trinitrine 0,15 mg (| Natispray (intérêt à discuter avec votre médecin) | |
| Antiagrégant* | Fluidifiant sanguin | Acide acétylsalicylique 300 mg | Aspégic; kardégic | 1 sachet/j |
| Antiseptique local | Désinfection cutanée | Clorhexidine aqueuse 0,05% | Bétadine dermique ou dakin...Antiseptiques avec meilleure action | |
| Crème solaire IP 60 | Protection solaire, écran total | | | |
| Crème cicatrisante | Réparation cutanée | Cu, Zn sulfate et oxyde | Cicalfate | 1 appli 3 /j |
| crème antiseptique | Désinfection de brûlure | Sulfadiazine argentique | Cetavlon, sterlane crème, bétadine pommade, hexomédine gel... | 1X/j |
| Anti-acide gastrique | Brûlures d'estomac | Aluminium/magnésium hydroxyde | Supralox, rocgel, gelox, mucal, xolaam... | Après chaque repas |
| Anti mal de mer | prévention du mal de mer | Scopolamine TTS 1 mg | Dramamine, nausicalm, marzine, nautamine | 1 6h avt départ |
| Anti diarrhéique | en cas de selles liquides >6/j | Lopéramide 2 mg | Diarsed, lactéol, Tiorfan (usage chez l'enfant en sus) , Smecta (pansement) | 1 à 6 gel/j |
| anti nausée | traitement du mal de mer | Métopimazine | Vogalib, motilium | 1 cp X 3/24h |
| Antibiotique | Infection des voies aériennes | Amox + Ac. Clav | Augmentin, ciblor, | A. 1,5 g/j E; 40mg/kg/j |
| | infection peau, sinus et poumons | Pristinamycine 500 mg | Pyostacine | A. 2 à 3 g/j E 50mg/kg/j |
| Collyre antiseptique | Infection œil | Héxamédine 0,1% 5mg | Vitabact, Biocidan | 2 gttesX4/j |
| Myorelaxant | Thiocolchicoside | Miorel | | |
| Matériel Pansements | Gel hydro alcoolique désinfection des mains | | | |
| | Tulles gras | | Urgotulle, adaptic, jelonet, vasilutle... | |
| | Compresses stériles 20X20 | | Sterilux | |
| | Bandes | | Nylex, Velpeau crêpe | |
| | Pansement hémostatique chut | | | |
| | Pansement américain absorbant | | | |
| | Sparadrap | | Albupore, Rouleau hypafix | |
| | Pansement stériles | | Aquafilm, medipore, tégaderm, urgostérile, cicaplaie | |
| | Suture cutanée | | Stéristrip | |
| | Agrafeuse cutanées | | Précise 3m | |
| Matériel Contusion | Bandes adhésive élastique | | Elastoplaste 3 cm et 5 cm, extensa plus | |
| | Bandes cohésive | | Coheban, Co-plus, Coheflex, nylexogrip, tensoplus | |
| | Ciseaux gescio | | | |
| Couverture de survie | Lutte contre froid ou le chaud | | | |